Le finastéride soupçonné d’engendrer des troubles sexuels pouvant aller jusqu’à l’impuissance

Compte Test - 2012-03-12 17:36:00 - Vu sur pharmacie.ma

Les effets secondaires du Propecia rapportés par des patients ayant pris ce traitement contre l'alopécie sont inquiétants : troubles de l'érection, baisse de la libido, voire impuissance. Si le risque d'effets secondaires délétères pour la sexualité est connu et mentionné dans la notice du produit, il est présenté comme transitoire. Seulement, certains patients ont rapporté des troubles persistant pendant des mois, voire des années après l'arrêt. D'ailleurs, l'agence fédérale du médicament (FDA) a renforcé sa surveillance sur la molécule. En France, l'Afssaps se veut rassurante après la parution d'un article sur le sujet dans Le Parisien.Le finastéride, principe actif du Propecia, a pour effet de bloquer l'action de l'hormone mâle, la testostérone, qui aggrave la calvitie chez les hommes qui y sont sujets. Le médicament permet donc de ralentir la chute des cheveux, sans l'éradiquer.Pour l'instant, les preuves sur la relation de cause à effet entre Propecia et difficultés sexuelles durables sont encore maigres et reposent essentiellement sur du déclaratif.En France, le patron de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a affirmé samedi que «les effets secondaires de ce traitement sont parfaitement connus» et qu'ils sont «réversibles» à l'arrêt du traitement. Selon le Pr Maraninchi, quand le Propecia est prescrit contre une calvitie, le risque de voir la libido diminuer est réel mais très faible. Il est légèrement plus fort quand le finastéride est utilisé contre l'hypertrophie prostatique car le dosage est plus élevé dans cette indication. Pour le patron de l'Afssaps, cette affaire relève «typiquement de la relation bénéfice/risque» que chaque patient doit bien mesurer, sans sous-estimer les risques secondaires.Pharmacies.ma - 12 mars 2012