

Ménopause : oestrogènes et risques cardiovasculaires chez les femmes

Compte Test - 2012-06-14 06:38:00 - Vu sur pharmacie.ma

Les résultats d'une étude menée sur 6 000 femmes âgées de plus de 65 ans par une équipe de chercheurs de l'Inserm dirigée par Pierre-Yves Scarabin, ont montré pour la première fois que des taux élevés d' $1\frac{1}{2}$ stradiol sanguin exposent à un risque plus important d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Ces résultats, publiés dans The Journal of American Heart Association, montrent que l'administration d' $1\frac{1}{2}$ strogènes ne permet pas de prévenir les maladies artérielles ischémiques chez les femmes ménopausées et pourrait même avoir un effet délétère chez les femmes plus âgées.

En effet, l'étude a montré pour la première fois que des taux élevés d' $1\frac{1}{2}$ stradiol sanguin exposent à un risque augmenté d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral sans que le lien de cause à effet ne soit démontré. Cette relation n'est pas influencée par les autres principaux facteurs de risque cardiovasculaire connus, notamment le diabète et l'obésité.

D'autres résultats montrent que les $1\frac{1}{2}$ strogènes semblent affecter certains mécanismes impliqués dans l'obstruction des artères à l'origine des maladies cardiovasculaires. Si l'effet coagulant des $1\frac{1}{2}$ strogènes est bien établi, leur rôle dans le processus inflammatoire est aujourd'hui une voie de recherche importante en particulier chez les femmes obèses où l'accumulation de tissus adipeux est associée à des taux élevés d' $1\frac{1}{2}$ strogènes. Pharmacies.ma - 14 juin 2012 (Source: Inserm)