Statines : un bénéfice pour le cœur très supérieur au risque de diabète

Compte Test - 2012-08-13 10:43:00 - Vu sur pharmacie.ma

En mars dernier, l'agence américaine du médicament, la FDA, avait révisé les mentions légales des statines aux Etats-Unis pour inclure le risque diabétique, à la suite des résultats de plusieurs études dont l'étude JUPITER sur la justification de l'usage des statines.

Une étude publiée vendredi par la revue médicale britannique Lancet, révèle que le rapport bénéfice-risque reste largement favorable aux statines.

Cette étude américaine, réalisée auprès de 17.603 personnes, avait mis à jour une augmentation des cas de diabète de type 2 chez les sujets traités par rosuvastatine par rapport aux sujets sous placebo.

Paul Ridker, du centre de prévention des maladies cardio-vasculaires de Boston, note que le risque de développer un diabète n'est pas le même chez tous les patients sous statines. Les patients ayant au moins un facteur de risque de diabète ont ainsi eu 28% de risques supplémentaires de développer cette maladie que le groupe témoin, alors qu'il n'y a pas de différence chez ceux n'ayant aucun facteur de risque.

Chez ces derniers, les statines ont eu pour effet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires de 52%, contre 39% de réduction chez les personnes à risque de développer un diabète.

Toutefois, le professeur australien Gerald Watts demande aux médecins d'être particulièrement vigilants avec les patients sous statine présentant des risques importants de diabète. "Ils doivent être informés du risque, surveillés régulièrement pour éviter une hyperglycémie, invités à faire de l'exercice physique afin de prévenir l'apparition du diabète" ajoute-t-il.sante-medecine.commentcamarche.net