Cancer du sein : l’observance du traitement en question

Compte Test - 2013-03-27 18:46:00 - Vu sur pharmacie.ma

49 % des femmes atteintes d'un cancer du sein suivent mal leur traitement. C'est ce qui ressort de l'étude, publiée dans le British Journal of Cancer, et réalisée par des chercheurs des universités de Dundee et de Glasgow. En effet, l'étude des dossiers médicaux de 3 361 patientes diagnostiquées d'un cancer du sein entre 1993 et 2008, a montré qu'elles sont de plus en plus nombreuses à suspendre leur hormonothérapie avant la fin des cinq années nécessaires à son efficacité. D'après les chercheurs, ce manque d'observance pourrait entraîner un risque accru de récidive et de mortalité.

L'étude a montré que la première année, 90 % des patientes suivent leur traitement ; puis, la deuxième année, elles ne sont plus que 82 % ; la troisième année, 77 % ; et enfin, au cours de la cinquième année, elles ne sont plus que 51 % à continuer un suivi correct de leur thérapie. Par ailleurs, entre 1993 et 2008, 36% des participantes sont décédées des suites d'une récidive. D'après les scientifiques, le fait d'abandonner son traitement hormonal augmenterait de 20 % le risque de mourir, suite au retour d'une tumeur plus agressive.

L'interruption de l'hormonothérapie est le plus souvent liée aux effets secondaires des médicaments utilisés, notamment les bouffées de chaleur, les sueurs, les nausées, ou une importante prise de poids.