

Résistance aux antibiotiques : une « menace d'ampleur mondiale » selon l'OMS

Compte Test - 2014-05-01 09:20:00 - Vu sur pharmacie.ma

Selon l'OMS, un nouveau rapport publié dresse un tableau très complet de la résistance actuelle aux antibiotiques, les données provenant de 114 pays. Il fait état de la présence d'une résistance aux antibiotiques dans toutes les régions du monde.

Le rapport, intitulé Résistance aux antimicrobiens: rapport mondial sur la surveillance, met l'accent sur la résistance aux antibiotiques de sept bactéries différentes, responsables de maladies graves courantes telles que les infections hématologiques (septicémie), les diarrhées, les pneumonies, les infections des voies urinaires et la gonorrhée.

Les principales conclusions du rapport sont notamment les suivantes:

- La résistance au traitement de dernier recours contre les infections potentiellement mortelles causées par une bactérie intestinale courante, *Klebsiella pneumoniae*, - les carbapénèmes - s'est propagée à toutes les régions du monde. *Klebsiella pneumoniae*, est une cause majeure d'infections nosocomiales telles que la pneumonie, les infections hématologiques ou les infections contractées par les nouveau-nés et les patients des unités de soins intensifs. Dans certains pays, du fait de la résistance, les carbapénèmes sont inefficaces chez plus de la moitié des patients traités pour des infections à *Klebsiella pneumoniae*.

- La résistance à l'un des médicaments antibactériens les plus largement utilisés pour le traitement des infections des voies urinaires dues à *E. coli*, - les fluoroquinolones - est très largement répandue. Dans les années 1980, lorsque ces médicaments ont été introduits pour la première fois, la résistance était quasiment nulle. Aujourd'hui, dans certains pays de nombreuses parties du monde, le traitement est désormais inefficace pour plus de la moitié des patients.

- L'échec du traitement de dernier recours contre la gonorrhée - les céphalosporines de troisième génération - a été confirmé en Afrique du Sud, en Australie, en Autriche, au Canada, en France, au Japon, en Norvège, au Royaume-Uni, en Slovénie et en Suède. Plus d'un million de personnes sont infectées par le gonocoque dans le monde chaque jour.

- Du fait de la résistance aux antimicrobiens, les patients sont malades plus longtemps et le risque de décès augmente. On estime par exemple que chez les personnes atteintes du *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM), le risque de décès est supérieur de 64% comparé au risque pour les personnes atteintes d'une forme non résistante de l'infection. La résistance augmente également le coût des soins du fait de la prolongation des séjours à l'hôpital et des soins plus intensifs requis.

Parmi les mesures importantes à adopter figure la prévention des infections pour qu'elles n'aient pas lieu du tout - moyennant une meilleure hygiène, l'accès à l'eau potable, la lutte contre les infections nosocomiales et la vaccination - et pour réduire les besoins en antibiotiques.

L'OMS appelle aussi l'attention de tous sur la nécessité de mettre au point de nouveaux produits diagnostiques, de nouveaux antibiotiques et d'autres outils pour permettre aux professionnels de santé de garder leur avance sur la progression des résistances.