Zika : le virus subsiste 6 mois après l'infection

Zitouni IMOUNACHEN - 2016-08-15 15:44:15 - Vu sur pharmacie.ma

Suite à la détection du virus Zika dans le sperme d'un italien six mois après les premiers symptômes de l'infection, les chercheurs recommandent d'allonger la durée d'utilisation de préservatifs pour toutes les personnes atteintes.

Les résultats de cette étude «soulignent la nécessité de recommander aux patients affectés de s'abstenir d'activité sexuelle ou d'utiliser un préservatif pendant au moins six mois», insistent les auteurs. Pour obtenir ces résultats, l'institut Spallanzani, spécialisé dans les maladies infectieuses, a effectué une série de prélèvements sur le patient désormais en bonne santé.

Cent-quatre-vingt-huit jours après les premiers symptômes, «l'échantillon de sperme était toujours positif», a annoncé l'institut en précisant que le jeune homme ne souffrait d'aucune maladie chronique ou déficience immunitaire. Pendant toute cette période, le patient a utilisé des préservatifs dans ses rapports avec son épouse, qui est pour sa part restée négative.

Rappelons que le virus Zika est le plus souvent transmis par une pique de moustique, mais il peut aussi l'être par voie sexuelle ou par un contact avec du sang contaminé. Il est lié à des malformations congénitales irréversibles dévastatrices comme la microcéphalie,