Paracétamol pendant la grossesse : une alerte exagérée

Zitouni IMOUNACHEN - 2016-08-23 01:29:00 - Vu sur pharmacie.ma

Une étude publiée par la revue internationale JAMA Pediatrics, suspecte le paracétamol pris pendant la grossesse d'être responsable de la survenue de troubles du comportement de l'enfant à l'âge de 7 ans.

Pourtant, le Pr Evie Stergiakouli et ses collègues du département d'épidémiologie de l'université de Bristol (Royaume-Uni) et du Centre de génétique, génomique et neuropsychiatrie de l'université de Cardiff ne savent pas pourquoi les mamans ont pris du paracétamol pendant leur grossesse, ils ne savent pas non plus les doses avalées ni même la durée de traitement suivi!

Sans le démontrer, les auteurs estiment que l'association mise en évidence par leur étude basée sur l'analyse de 7796 femmes enceintes enrôlées en 1991 et 1992, «suggère» que «cela pourrait être dû à un mécanisme intra-utérin». Toutefois, lorsque l'on regarde de près les résultats affichés, on s'aperçoit que la plupart ne sont pas statistiquement significatifs et que les auteurs se focalisent surtout sur ceux qui confirment leur hypothèse. Il n'y a, par exemple, pas d'augmentation statistiquement significative des difficultés comportementales (SDQ score) rencontrées par les enfants à l'âge de 7 ans consécutive à la prise de paracétamol à 18 semaines de grossesse par les femmes enceintes. Qu'importe! Les auteurs soulignent une augmentation lorsque la prise à eu lieu 32 semaines de grossesse.