

TABLE DES VACCINS

Abdelkader El Jabri, Pharmacien d'officine, le 29 mars 2007

SOURCE : VIDAL 2007

LEGENDE :

J : jour - M : mois - A : année - M6 : 6 mois après la dernière injection - 1A : 1 an après la première injection - A5... : chaque 5 ans – A5-10... : tous les 5 à 10 ans -

RM : vaccin réservé au Ministère de la Santé publique.

VACCIN	Prix DH	Hépatite A	Hépatite B	Rougeole	Oreillons	Rubéole	Tuberculose	Méningites	Poliomyélite	Coqueluche	Diphtérie	Tétanos	Grippe	Hib ¹	Varicelle	Rage	Fièvre jaune	Typhoïde	Infections pneumococciques	SCHEMA VACCINAL				
																				PRIMO-VACCINATION			RAPPEL	
																				J0	J30	J60	A1	
Act-Hib ^{2_3}	218,60													+						J0	J30	J60	A1	
Avaxim ⁴	385,00	+																		J0			M6-12	
BCG ⁵	43,80						+													J0			-	
BCG Pasteur ⁵	52,60						+													J0			-	
Dultavax	127,00								+		+	+								J0	J30	J60	A1	A5-10...
DT-Polio	36,10								+		+	+								J0	J30	J60	A1	A5-10...
Engérix B Pédiatrique ⁶	80,00		+																	J0	J30	J60+1A	-	
Engérix B Adultes ⁷	180,00		+																	J0	J30	J60+1A	-	
Fluarix ⁸	75,00												+							J0			A1...	
GenHévac B ⁹	148,40		+																	J0	J30	M5-12	-	
Havrix Junior ¹⁰	270,00	+																		J0			M6-12	
Havrix Adultes ¹¹	420,00	+																		J0			M6-12	
Hiberix ^{2_3}	188,30													+						J0	J30	J60	A1	
Infranrix Polio (IPV) ^{3_12_13}	177,00								+	+	+	+								Cf. Commentaire en bas				
Infranrix Polio(IPV)+Hib ^{3_13}	301,00								+	+	+	+		+						J0	J30	J60	A1	

¹ Hib : *Haemophilus influenzae* type b (germe responsable de méningites, septicémies, épiglottites, infections respiratoires...)

² Schéma valable pour enfants < 6 mois. Pour les enfant de 6 mois à 1 an : J0 – J30 + une injection de rappel à l'âge de 18 mois. Pour les enfant de 1 à 5 ans : 1 seule injection

³ Première dose à l'âge de 2 mois

⁴ Indiqué chez l'adulte et l'adolescent à partir de 16 ans

⁵ Enfant > 1 an : 0.1 ml de BCG. Enfant < 1 an : 0.05 ml de BCG

⁶ Indiqué chez l'enfant < 15 ans (première dose à l'âge de 2 mois). Autre schéma vaccinal : J0- J30 – 6M

⁷ Indiqué chez l'adulte et l'enfant > 15 ans. Autre schéma vaccinal : J0- J30 – 6M. Schéma pour hémodialysés (2 doses adultes à chaque injection) : J0 – J30 – J60 – 6M

⁸ Vaccin annuel à faire en automne. Adultes et enfants > 36 mois : 1 dose. Enfants de 6 à 35 mois : ½ dose (à renouveler après 1 mois pour les enfants non vaccinés auparavant)

⁹ Indiqué chez le nourrisson (première dose à l'âge 2 mois), l'enfant et l'adulte : 1 dose entière quelque soit l'âge du sujet. Hémodialysés (1 dose à chaque injection) : J0 – J30 – J60 – 4M – 12M

¹⁰ Indiqué chez l'enfant de 1 à 15 ans

¹¹ Indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans

¹² Vaccin utilisé pour l'injection de rappel chez les enfants âgées de 16 mois à 13 ans (peut être utilisé en primovaccination)

¹³ Contient un vaccin anti-coquelucheux acellulaire

VACCIN	Prix DH	Hépatite A	Hépatite B	Rougeole	Oreillons	Rubéole	Tuberculose	Méningites	Poliomyélite	Coqueluche	Diphtérie	Tétanos	Grippe	Hib ¹	Varicelle	Rage	Fièvre jaune	Typhoïde	Infections pneumococciques	SCHEMA VACCINAL				
																				PRIMO-VACCINATION			RAPPEL	
Mencévax A+C+W+Y135 ¹⁴	176,40							+												J0			-	
Méninococcique A+C ¹⁵	100,60							+												J0			-	
Pentacoq ^{3_16}	251,00								+	+	+	+		+						J0	J30	J60	A1	
Pentaxim ^{3_13}	298,00								+	+	+	+		+										
Pneumo-23 ¹⁷	162,00																		+	J0			A3 à 5...	
Poliomyélitique oral	RM								+											J0	J30	J60	A1	A5...
Priorix ¹⁸	149,00			+	+	+														J0	J30	-	-	
ROR (Trimovax) ¹⁸	117,00			+	+	+																		
Rouvax ¹⁹	63,20			+																J0			-	
Rudivax ²⁰	52.90					+														J0			-	
Stamaril ²¹	RM																+			J0			A10...	
Tétracoq ^{3_16}	44,90								+	+	+	+								J0	J30	J60	A1	
Tétraxim ^{3_13}	160,00								+	+	+	+												
T-Polio	34,70								+			+								J0	J30	J60	A1	A5-10...
Typhim Vi ²²	135,00																	+		J0			-	
Vaccin rabique Pasteur ²³	540,40															+				J0	J7	J28	A1	A5...
Vaccin rabique Mérieux ²³	264,50															+								
Vaccin tétanique ²⁴	15,00											+								J0	-	J30	M6-12	A10...
Varilrix ²⁵	380,00														+					J0			-	
Vaxigrip ⁸	72,80												+							J0			-	

¹⁴ Indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans pour l'immunisation contre les méningites dues aux méningocoques des sérogroupes A, C, W et Y135. Ce vaccin est exigé par les autorités saoudiennes pour le pèlerinage de la Mecque et la 'Oumra, 1 seule injection 10 jours minimum avant le départ

¹⁵ Indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans pour l'immunisation contre les méningites dues aux méningocoques des sérogroupes A et C

¹⁶ Contient le vaccin anti-coquelucheux « entier ou cellulaire »

¹⁷ Vaccin indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans

¹⁸ La première dose est recommandée à l'âge de 12 mois et la seconde entre 13 et 24 mois (respecter un délai d'au moins un mois entre les deux vaccinations). Pour les enfants entrant en collectivité avant l'âge de 12 mois : première dose à 9 mois suivie d'une seconde dose entre 12 et 15 mois. Si le vaccin monovalent contre la rougeole est utilisé entre 6 et 8 mois (...), deux doses de vaccin trivalent seront ensuite nécessaires pour obtenir une immunité efficace contre les oreillons

¹⁹ Une seule injection est conseillée à partir de 12 à 15 mois. Mais pour les enfants vaccinés à 9 mois, en particulier ceux vivants en collectivité, une 2^{ème} injection est recommandée entre 3 et 6 ans

²⁰ Indiqué chez la jeune fille et la femme adulte. Assurer une contraception efficace poursuivie dans les deux mois suivants la vaccination

²¹ Contre-indiqué chez l'enfant de moins de 6 mois

²² La durée de protection de ce vaccin est de 3 ans

²³ La vaccination préventive ne dispense pas d'un traitement curatif qui doit être mis en œuvre le plus tôt possible en cas d'exposition avérée ou suspecte

²⁴ Indiqué chez l'adulte non ou mal vacciné. Schéma national d'immunisation de la femme en âge de procréer (15 à 44 ans) contre le tétanos néonatal : J0-J30-M6-A1-A1 (5 doses)

²⁵ Enfants de 12 mois à 12 ans (inclus) : 1 dose. A partir de 13 ans : 2 doses avec un intervalle de 6 à 10 semaines entre les deux doses