




U.S.P 10 FEV 2011

Circulaire n° : 15 /DELM/35



Monsieur le Président du Conseil National de l'Ordre National des Médecins
Messieurs les Directeurs des Centres Hospitaliers Mohammed VI, Hassan II, Ibn Sina et Ibn Rochd
Monsieur le Directeur de l'Institut Pasteur du Maroc
Madame le Directeur de l'Institut National d'Hygiène
Messieurs les Directeurs Régionaux de la Santé

Objet : Résistance du Gonocoque à la Ciprofloxacine

Conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Maroc a adopté l'approche syndromique en matière de lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), depuis l'année 1998.

Cette approche requiert la conduite régulière d'études de prévalence des germes dans les syndromes d'IST et de leur résistance aux antibiotiques (particulièrement le Gonocoque), afin de garantir l'efficacité des protocoles thérapeutiques préconisés.

Dans ce cadre, le Ministère de la Santé a mené au cours de l'année 2009, une étude nationale de « Prévalence des IST dans les écoulements urétraux et Sensibilité de Neisseria Gonorrhoeae aux antibiotiques ».

L'analyse de la sensibilité aux antibiotiques des souches de Neisseria Gonorrhoeae recueillies lors de ladite étude a montré l'émergence d'une résistance à la Ciprofloxacine. Ces mêmes souches restent sensibles à la Ceftriaxone.

**Nouveaux protocoles thérapeutiques
pour la prise en charge syndromique de l'écoulement urétral
et de la cervicite**

1- Traitement syndromique de l'écoulement urétral chez l'homme

- Ceftriaxone 250 mg injectable dose unique (au lieu de Ciprofloxacin 500mg)

+

- Doxycycline 100mg VO, deux fois par jour pendant 7 jours

2- Traitement syndromique de la cervicite en dehors d'une grossesse

- Ceftriaxone 250 mg injectable dose unique (au lieu de Ciprofloxacin 500mg)

+

- Doxycycline 100mg VO, deux fois par jour pendant 7 jours

+

- Metronidazole 2g VO, en prise unique

3- Traitement syndromique de la cervicite en cas de grossesse


- Ceftriaxone 250 mg injectable dose unique

+

- Erythromycine 500mg VO, 4 fois par jour, pendant 7 jours

Par conséquent, toute prescription de la Ciprofloxacin pour le traitement des infections à Neisseria Gonorrhoeae doit être proscrite et remplacée par la Ceftriaxone, notamment en matière de prise en charge syndromique de l'écoulement urétral chez l'homme et de la cervicite chez la femme (voir nouveaux protocoles joints).

Nous attachons une grande importance à la diffusion la plus large de la présente circulaire.

 Le Secrétaire Général
Rahhal EL-MAKKAOU

