PRÉPARATIONS OFFICINALES COURANTES

Pharmacies.ma

ALCOOL BORIQUE
- Acide borique…….....2 g
- Alcool à 60°…….....98 g

S'aider d'un bain-marie; filtrer.

SOLUTE ALCOOLIQUE DE CAMPHRE
Alcool camphré fort.
- Camphre…….....10 g
- Alcool à 90°…….....90 g

Alcool Camphré faible
- Camphre…….....2,5 g
- Alcool à 60°…….....97,5 g

Peser le camphre et le triturer dans un mortier, ensuite ajouter l'alcool, faire dissoudre le camphre filtrer rapidement sur coton.

Propriétés : en friction comme stimulant ou comme antiseptique.
Remarque : à éviter chez l'enfant de moins de 30 mois.

SOLUTE ALCOOLIQUE D'IODE OFFICINAL (TEINTURE D'IODE)
- Iode…….....5 g
- Iodure de potassium…….....3 g
- Alcool à 95°…….....85 g
- Eau déminéralisée…….....7 g

Dissoudre l'iodure de potassium dans l'eau. Ajouter l'alcool puis l'iode. Laisser en contact 1h en agitant. Filtrer sur coton.
Il faut utiliser un flacon teinté.
Propriétés: Révulsif, désinfectant et cicatrisant des plaies .

ALCOOL IODE A 1%
- Iode…….....1 g
- Alcool à 80°…….....100 ml

Conservation : dans un flacon teinté (15jours).

Remarques:
- A éviter chez les enfants de moins de 30 mois.
- Ne pas associer avec les organo-mercuriels ex: mercurochrome.

www.pharmacies.ma - Droits réservés

COLLUTOIRE AU BLEU DE METHYLENE

- Bleu de méthylène officinal.....0.6 g
- Glycérine officinale.....30 g
- Eau.....qs

Remarque:

la quantité d'eau à ajouter est très faible et permet la dissolution du bleu de méthylène.

- Humecter le bleu de méthylène par quelques gouttes d'eau distillée dans un mortier de préférence en verre.
- Ajouter la glycérine et mélanger jusqu ' à dissolution complète.

Remarques:

- Seul le collutoire peut être utilisé comme traitement d'appoint des affections de la cavité buccale.
- Utiliser un flacon à large ouverture.

DAKIN.

- Bicarbonate de sodium.....15 g
- Liqueur La Barraque.....75 ml
- Permanganate de potassium.....~0,01 g
- Eau bouillie froide qsp.....1000 ml

Laisser reposer quelques heures puis filtrer conserver à l'abri de la lumière.

Remarque : le Dakin a une durée de conservation de 15 jours.

SOLUTION D'EAU OXYGENEE :

Le soluté concentré d'eau oxygénée est une solution aqueuse contenant environ 30 % en poids de peroxyde d'hydrogène et susceptible de dégager cent à cent dix fois son volume d'oxygène gazeux, il suffit de le diluer au 1/10 en poids pour obtenir le soluté officinal d'eau oxygénée.

Remarque :

pour stabiliser le soluté ainsi préparé on peut ajouter 1.1 ‰ d'acide benzoïque.

EAU DE DALIBOUR FAIBLE

- Sulfate de cuivre.....1 g
- Sulfate de zinc.....3,5 g
- Teinture de safran.....1 g
- Alcool camphré.....10 g
- Eau distillée qsp .....1000 ml

www.pharmacies.ma - Droits réservés

EAU DE DALIBOUR FORTE
- Sulfate de cuivre.....10 g
- Sulfate de zinc.....3,5 g
- Teinture de safran.....1 g
- Alcool camphré.....10 g
- Eau distillée qsp.....1000 ml

EOSINE ALCOOLIQUE A 2%
- Eosine.....2 g
- Alcool à 60°.....98 g

EOSINE AQUEUSE A 2%
- Eosine.....2 g
- Eau distillée.....98 g

Remarque : L'eosine n'est ni antiseptique ni bactériostatique.

HUILE CAMPHREE
- Camphre .....10 g
- Huile d'olive ou d'arachide.....90 g

Indication : souvent utilisée comme massage chez les sportifs.

MERCURESCEINE A 2%
- Mercurescéine sodique .....2 g
- Eau distillée.....98 g

SOLUTION ALCOOLIQUE DE MERCURESCEINE (MERCUROCHROME)
- Mercurescéine sodique.....20 g
- Acétone.....100 ml
- Alcool à 90°.....540 ml
- Eau.....360 ml

Faire dissoudre le sel de mercure dans l'eau légèrement tiède. Par ailleurs, mélanger acétone et l'alcool et les ajouter à la solution aqueuse. Agiter.
Remarque : habituellement c'est la solution aqueuse à 2% qui est la plus utilisée.

LIQUEUR DE HOFFMANN
- Ether.....50 ml
- Alcool à 90°.....50 ml

SOLUTE DE MILIAN ALCOOLIQUE
- Violet de gentiane.....0,25 g
- Vert de méthyle.....0,25 g
- Alcool à 60°.....100 ml

www.pharmacies.ma - Droits réservés