

Vaccination anti-covid-19 : Conduite à tenir devant certaines situations cliniques particulières*

Médicaments et vaccination anti-Covid-19

ALLERGIES AUX MÉDICAMENTS

La vaccination est contre-indiquée en cas d'antécédents de CHOCS ANAPHYLACTIQUES SÉVÈRES



Il est autorisé de vacciner les sujets traités par :
PLAQUENIL®, Methothréxate ou Valproate
(**DEPAKINE®** et génériques)



SUJET SOUS ANTICOAGULANT

- ◆ Peut être vacciné avec une aiguille fine en appliquant une pression de 5 minutes sur le point d'injection.
- ◆ Un arrêt de traitement de 24 à 48 h peut également être préconisé avant la vaccination.



Pathologies et vaccinations anti-covid-19

- ◆ Diabète équilibré
- ◆ Hypertension artérielle
- ◆ Polyglobulie,
- ◆ Dysthyroïdies
- ◆ Leucémies non-aigues



Le sujet peut être vacciné.

Cancer :

La vaccination doit avoir lieu une semaine avant la chimiothérapie ou la radiothérapie ou une semaine après.

Leucémies aigues :

Le sujet peut être vacciné avec un suivi quantitatif des anticorps

Tuberculose :

- ◆ S'il s'agit des deux premiers mois de traitement anti-tuberculeux, la vaccination est contre-indiquée
- ◆ Au delà du 3^{ème} mois de traitement anti-tuberculeux, le sujet peut être vacciné en tenant compte de son état physique

Covid-19

- ◆ **Covid 19 asymptomatique ou paucisymptomatique** : La vaccination doit avoir lieu **un mois** après la guérison clinique.
- ◆ **Covid-19 sévère ou critique** : La vaccination doit avoir lieu **3 mois** après la guérison clinique.
- ◆ **Covid-19 post vaccinal** : L'administration de la 2^{ème} dose doit se faire **après 6 mois**.

* Source : Ministère de la Santé (Maroc) en cas de doute, demandez conseil à votre médecin.